




Ante un paciente con sospecha de infección y sobre todo cuando dispongas de antibiograma= AJUSTA LA ANTIBIOTERAPIA, USA SIEMPRE EL MENOR ESPECTRO (DESESCALA)



PRIORIZA ++

- PENICILINAS
- AMPICILINA
- CLOXACILINA
- CEFAZOLINA
- AMOXICILINA
- CEFUROXIMA
- FOSFOMICINA

Prioriza +

- AMOXICILINA/
CLAVULANICO
- CEFTRIAXONA
- CEFOTAXIMA




USO LIMITADO (evitar siempre que sea posible cobertura antipseudomónica)

- CEFEPIMA
- CEFTAZIDIMA
- MOXIFLOXACINO
- LEVOFLOXACINO
- CIPROFLOXACINA
- PIPERACILINA/TAZOBACTAM

USO RESTRINGIDO (se realizara asesoría PROA para intentar desescalar)

- IMIPENEM/CILASTATINA
- MEROPENEM
- ERTAPENEM
- VANCOMICINA
- DAPTOMICINA
- LINEZOLID
- TEICOPLANINA



USO EXTREMADAMENTE RESTRINGIDO, LIMITADO EQUIPO PROA (por antibiograma/ código sepsis)

- CEFTOLOZANO/TAZOBACTAM
- CEFTAZIDIMA/AVIBACTAM
- MEROPENEM/VABORBACTAM
- CEFIDEROCOL
- CEFTOBIPROL
- AZTREONAM
- TIGECICLINA
- TEDIZOLID
- CEFTAROLINA
- ORITAVANCINA
- DALBAVANCINA
- DELAFLOXACINO



21 de noviembre de 2023

SI TIENES DUDAS CONSULTA ENFERMEDADES INFECCIOSAS 8:00-20:00 horas
(BUSCA 769316)



**INDICACIONES DE USO DE ANTIOTERAPIA
EXTREMADAMENTE RESTRINGIDA
(uso limitado a equipo PROA)
(Comisión Infecciones, 20 junio 2024)**

ANTIBIOTICO	INDICACIÓN GRUPO PROA
CEFTOLOZANO/TAZOBACTAM	Infecciones (neumonía nosocomial, ITU e infección intraabdominal complicada) por gram negativos aerobios solo por antibiograma en ausencia de otras alternativas
CEFTAZIDIMA/AVIBACTAM	Infecciones por gram negativos aerobios solo por antibiograma en ausencia de otras alternativas
MEROPENEM/VABORBACTAM	Infecciones causadas por enterobacterias productoras de KPC, cuando no exista una alternativa terapéutica.
CEFIDEROCOL	Infecciones por gram negativos aerobios solo por antibiograma en ausencia de otras alternativas (evitar uso en <i>Acinetobacter</i>)
CEFTOBIPROL	Neumonía en gram positivos en ausencia de otras alternativas
AZTREONAM	Alergia demostrada a B-lactámicos
TIGECICLINA	Enterobacterias productoras de carbapenemasas en ausencia de otras alternativas
TEDIZOLID	Infecciones por gram positivos MR si contraindicación de linezolid (IPPB, neumonía, osteoarticular)
CEFTAROLINA	Actividad bactericida frente a neumococos, estreptococos, <i>S. aureus</i> y enterobacterias. Limitado uso en SAMR con fracaso/contraindicaciones alternativas (neumonía, IPPB).
DALBAVANCINA	OPAT en infecciones gram positivos MR IPPB (off-label infecciones intravasculares, osteomielitis, infección protésica, SNC)
ORITAVANCINA	OPAT en infecciones gram positivos MR IPPB (=dalbavancina)

ITU: infección tracto urinario; MR: multirresistentes; IPPB: infección piel y partes blandas; SAMR: *Staphylococcus aureus* resistente a oxacilina; SNC: sistema nervioso central. OPAT: antibioterapia en régimen ambulatorio.

Si tienes dudas, necesitas emplear uno de ellos o necesitas colaboración, estamos disponibles de 8-20h en el busca de Infecciosas (769316) e interconsulta Infecciosas